

INFORMATION

No. 2505-21

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記項目につきまして、検査内容を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白

記

■変更内容

コード	検査項目名	変更箇所	新			旧		
2973	低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC)	検査方法	CLEIA法			ECLIA法		
		備考	溶血により測定値に影響を受ける場合がありますので、溶血した検体は使用しないでください。			—		
1890	抗ガラクトース欠損IgG抗体定量(CARF)	所要日数	4～7日			3～5日		
		検査方法	CLEIA法			ECLIA法		
		報告範囲	1.0未満～最終値			1.1未満～最終値		
0736	エストラジオール(E ₂)	基準値	男性		15～48	男性		14.6～48.8
			女性	卵胞期	29～196	女性	卵胞期	28.8～196.8
				排卵期	37～525		排卵期	36.4～525.9
				黄体期	45～491		黄体期	44.1～491.9
				閉経後	47以下		閉経後	47.0以下
			妊婦	前期	209～ 4289	妊婦	前期	208.5～ 4289
				中期	2808～ 28700		中期	2808～ 28700
				後期	9875～ 31800		後期	9875～ 31800

(裏面へ続く)

■変更日

2025年 5月 31日(土) 受付分より

株式会社 武蔵臨床検査所

* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。


〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8

TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659

URL <http://www.e-musashi.co.jp>


低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC)と 抗ガラクトース欠損IgG抗体定量(CARF)の相関図

低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC)



(委託先検討データ)

抗ガラクトース欠損IgG抗体定量(CARF)



(委託先検討データ)